

FICHA DE VACUNACIÓN

CONCEPTO DE VACUNAS: DE: Juan Junior Melgarejo Rajo

1. Vacunación oral: Consiste en diluir el medicamento en el agua de los animales o también se puede incorporar el medicamento en el alimento. Es importante que los bebederos estén limpios, enjuagados con agua pura y sin sustancias químicas antes de verter el medicamento.

2. Vacuna ocular: La vacuna por gota en el ojo del animal.

3. Vacuna intramuscular: Esta vacuna se aplica en la parte posterior del muslo. La aguja se coloca oblicuamente al hueso fémur y en dirección a la cabeza. Esta técnica se utiliza principalmente para aplicar antibióticos, vitaminas u hormonas. Se recomienda que lo aplique un especialista.

4. Vacuna subcutánea: esta técnica consiste en introducir la aguja en medio de la piel y la carne. Generalmente se pellizca la piel de la parte superior del cuello y se deposita el medicamento debajo de esta. La aguja debe quedar entre la piel y el cuerpo. Se utilizan agujas finas de 0,6 a 0,8 mm. Después de la inyección se recomienda masajear la zona.

Edad	Vacuna	Vía de administración
1 día	Marek	Subcutánea
7 días (primera dosis)	Enfermedad respiratoria crónica	Subcutánea
COMPLEMENTO: TRIPLE AVIAR: NEWCASTLE- GUMBORO - BRONQUITIS INFECCIOSA		
4 semanas (primera dosis)	Newcastle La Sota tipo B1	Ocular
7 semanas (segunda dosis)	Newcastle La Sota tipo B1	Oral (en agua de bebida)
8 semanas (primera dosis)	Cólera aviar	Subcutánea
10 semanas (primera dosis)	Diftero viruela aviar	En el muslo por raspaje
ANEMIA INFECCIONA AVIAR		
12 semanas (segunda dosis)	Enfermedad respiratoria crónica	Subcutánea
COMPLEMENTO: TRIPLE AVIAR: NEWCASTLE- GUMBORO - BRONQUITIS INFECCIOSA		
12 semanas (tercera dosis)	Newcastle La Sota tipo B1	Oral (en agua de bebida)
14 semanas (segunda dosis)	Diftero viruela aviar	En el muslo por raspaje
15 semanas (segunda dosis)	Cólera aviar	Subcutánea
16 semanas (cuarta dosis)	Newcastle La Sota tipo B1	Oral (en agua de bebida)
20 semanas (quinta dosis)	Newcastle La Sota tipo B1	Oral (en agua de bebida)
24 semanas (sexta dosis)	Newcastle La Sota tipo B1	Oral (en agua de bebida)

Recomendaciones generales:

- Vacunar solo aves sanas.
- Guardar y transportar las vacunas las vacunas según lo indique el fabricante
- Controlar la fecha de caducidad.
- Utilizar solamente el diluyente correspondiente
- Administrar la dosis apropiada (1 dosis/ave)
- Usar materiales limpios y esterilizados (agujas, inyectores)
- Limpiar profusamente todo el material utilizado luego de la vacunación
- Desinfectar los restantes (frascos, tapones, cajas, etc.) antes de disponer de ellos apropiadamente.
- Lavar y desinfectar la ropa de trabajo, comenzando por las botas y lavar y desinfectar las manos.
- Registrar la vacunación, incluyendo el número del lote de producción de la vacuna.
- Controlar al tiempo correspondiente el efecto de la vacunación (palpación, serología, etc.)